

IMPACT	МОБІЛЬНІ КЛІНІКИ						
Пацієнт №	106065						
Дата	09-09-2026						
ПІБ	ДУДКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА						
Телефон	380986186429	Населений пункт	Широке	Стать	жіноча		
Дата народження	1968-05-05	Вік	58	Інвалідність	відсутня	Статус	жіноча
Для потреб гуманітарного медичного проєкту даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" Документ 2297-VI від 16.09.2022 року							
_____ПІДПИС							
Консультаційний висновок лікаря							
ПІБ лікаря	Лікар: Наталя Колісник спеціалізація: сімейний лікар						
Скарги: періодичне підвищення АТ, головний біль, шум у вухах, періодичне запаморочення, прискорене серцебиття , періодичні помірні болі в епігастрії, часта печія, біль в суглобах.							
Анамнез хвороби: ІХС, ГХ тривало. Страждає на ЦД 2 типу.							
Об'єктивне обстеження: Дихання везикулярне. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ – 160\90. Ps – 94. SpO2 – 98%. Сечова кислота - 387. Холестерин - 3,13							
Діагноз: ІХС. АКС. ГХ 2ст. 2ст. ССР2. СН 2Аст. ЦД 2тип, середньотяжка течія, субкомпенсований. Хронічний гастродуоденіт. GERX. Гонартроз. Подагричний артрит?							
Рекомендації: Дієта стіл 9 по Певзнеру. Кров на Глікований гемоглобін кожні 3 місяці. Метформін пролонгованої дії (Сіофор) 1000мг 1т двічі на день, Гліклазид 60мг 1т в обід, Джардінс\ Форксіа 10мг 1т вранці, Тіара дуо (Вальсакор Н) 160\12,5мг по 1т вранці. Карведілол 25мг по 1 по 1т в 12:00. Спіронолактон (Верошпірон, Еплепрес) 100мг по 1т о 12:00. Леркамен (ванлерк, занідип, лерканія) 20мг по 1т ввечері. Магнікор (кардіомагніл, кардіодар, лоспірин, АСК) 75мг по 1т ввечері. Аторвастатин (розувостатин, симвастатин) 20мг по 1т ввечері. Трифас (Торсід) 10мг по 1т вранці натще 2 рази на тиждень або Фуросемід 40мг по 1т вранці натще 2 рази на тиждень + аспаркам по 1т тричі на день в той же день. Моксопрес (моксонідин, Фізіотенз) 0,2- 0,4- (до 0,6мг на добу максимально, розділених на 2 прийоми) або Каптопрес (фенігедин, ніфедипін) 1т під язик як швидка допомога при кризах. Омепразол 20мг по 1т двічі на день – 10 днів, далі по 1т натще – 2 тижні. Алмагель М (гавісконт, рені, печайвські) по 1т при печії. Мотоприд (ітомед) 50мг по 1т тричі на день до їжі – 2 тижні, далі по 1т двічі на день – 2тижні. Дієта при подагрі стіл 6 по Певзнеру. Алопуринол 300мг по 1\2т вранці (або Подаграт (подафеб, фебумакс, єврофеб) 80мг вранці) тривало. Підвищення дози, за необхідності, через 3-4 тижні. Контроль сечової кислоти раз на три місяці. Диклофенак 50мг\ Фаніган (або: Ібупрофен 400мг або ФОРСАНЕК 60-90 мг, ксефокам-ларфікс 8мг,) по 1т двічі на день після їжі– 10 днів, Омепразол 20мг по 1т натще – 2 тижні.							
ВСІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО Проєкт реалізується за підтримки Ukrainian Humanitarian Fund (UHF).							

Я, **ДУДКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА** одержав(ла) інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

Я, **ДУДКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА** ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав (ла) в повному обсязі роз'яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення. Зобов'язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стану дитини). Я поінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитись на стані здоров'я.

Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування. Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров'я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЗОК Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 448 103 e-mail: help@fortitude.org.ua ВСІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО Проект реалізується за підтримки Ukrainian Humanitarian Fund (UHF)